



AVERTISSEMENTS AGRICOLES[®]

REGION CENTRE

www.srpv-centre.com

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

Bulletin technique n° 05 du 01/03/2001 - 2 pages + 1 dépliant

Colza

Stades : "reprise de végétation" à "boutons accolés encore cachés".

Charançons de la tige

Le temps froid et humide était plutôt défavorable au vol de charançon de la tige du colza, mais il y a quand même eu quelques captures dans :

- Le Loir et Cher : à Lancé (23/02) et Le Gault du Perche (26/02),
- L'Indre et Loire : à Chaveignes et Chambourg (26/02),
- L'Indre : à Bouges le Château (22/02) et Sassiérges St Germain (24/02).

Pas de nouvelles captures à Rians, Presly, Oizon, La Chapelotte, Henrichemont, Yvoy le Pré, Méry es Bois, Aubigny (18), Villefrancoeur, Vallières les Grandes, Savigny/Braye (41), Gy les Nonains, Amilly, St Loup de Gonois (45), Escorpain, Orrouer, Dampierre/Avre, Réclainville, Flacey (28).

Rappel : L'intervention est à prévoir 8 à 10 jours après les premières captures. La ponte est possible quand les températures sont supérieures à 5°C.

Maladies


- Présence d'oïdium dans quelques parcelles en Indre et Loire, Pays Fort du Cher et Loiret.

- Quelques plantes isolées atteintes de **cylindrosporiose** ont été observées dans des parcelles du Nord du Cher.

Description des symptômes sur feuilles : taches de couleur beige clair entourées de petits points blancs (acervules), déformations des feuilles (dessin ci-dessous).

A surveiller sur variétés sensibles.

Taches de cylindrosporiose sur feuille de colza



Blé

Stades : fin tallage à épi 1,3 cm.

Piétin-verse

Le froid a temporairement ralenti le développement de la maladie (voir graphe et cycle page suivante).

L'intervention contre le piétin-verse, en année où la maladie est précoce, peut être réalisée entre "épi 1 cm" et "1 noeud".

Dans les parcelles à risque piétin :

- les interventions à base de prochloraz pourront être réalisées si le stade "épi 1 cm" est atteint, dès que les conditions climatiques seront redevenues favorables,

- attendre encore pour l'intervention si elle est prévue avec du cyprodinil, mais elle devra toutefois être précoce (ne pas dépasser 1 noeud).

Septoriose

Dans plusieurs parcelles, on observe un inoculum important sur les feuilles.

A suivre.

Orge d'hiver

Maladies du feuillage

- Les taches de **rynchosporiose** sont fréquentes.

- Des symptômes de **rouille naine** sont aussi observés dans le Cher et l'Indre et Loire.

A suivre.

Féverole d'hiver

Premiers symptômes d'**anthracnose** observés dans le Cher.

Pour info

- Premiers semis d'orge de printemps (Cher).

- Quelques épis gelés dans de rares parcelles très avancées du Cher.

- Des symptômes de nanisme observés sur colza (analyses en cours).



Nos bulletins sont disponibles sur notre site Internet :

srpv-centre.com

Abonnez-vous à cette formule et bénéficiez de tarifs préférentiels !

Colza

Charançon de la tige du colza : quelques nouvelles sorties.

Blé

Piétin-verse : intervention possible sur parcelles à risque à "épi 1 cm" dès le retour de conditions climatiques favorables.

Maïs

Dépliant produits à conserver.

D.R.A.F. CENTRE
Service Régional de la
Protection des Végétaux

93, rue de Curambourg
45404 Fleury les Aubrais
Tél. 02.38.22.11.11
Fax 02.38.84.19.79
srpv-centre@terre-net.fr


Imprimé à la Station
d'Alertes Agricoles
de la Région CENTRE
Le Directeur-Gérant :
M. HANRION
Publication périodique
C.P.A.P. n° 80530
ISSN n° 0757-4029

Diffusion en collaboration
avec la FREDEC
CENTRE (Art L252-1 à
L252-5 du Code Rural)

D3 4PJ 43155

7261

Piétin - Verse



MODELE TOP PIETIN-VERSE au 28/02/2001

Dynamique de la maladie - Souches Rapides - FLEURY LES AUBRAIS (45) :
comparaison de différentes dates de levées par rapport à l'année 94/95 en situation à risques importants

